AMS实验每天电子流强的测量与周期性特征分析

苏彤

山东高等技术研究院

2021年8月

中国物理学会高能物理分会第十三届全国粒子物理学术会议

宇宙线与太阳物理

- 带电宇宙线在日球层中的传播受其质量和电荷的影响
- 不同的太阳调制使得宇宙线流强随时间的变化具有不同的结构

- 电子是宇宙线中丰度最高的负电荷粒子, 也是带电宇宙线中质量最轻的粒子, 对于研究日球层中宇宙线粒子的传播具有独特的意义

宇宙线流强长周期性变化

- 与太阳活动周期相关的11年周期
- 与太阳磁场极性相关的22年周期

AMS于2018年发表的电子每27天的流强能够观测到宇宙线流强的长期变化趋势

宇宙线流强短周期性变化

- 太阳表面存在的冕洞使得宇宙线流强产生与太阳自转相当（约27天）或更短（如13.5天或9天）的周期

宇宙线流强非周期性变化

- 福布斯下降(Forbush Decrease ,FD)是一种常见的宇宙线流强非周期的变化
- 目前认为福布斯下降与太阳表面剧烈的活动（如日冕物质抛， Coronal Mass Ejection, CME)有关

地面中子堆台站无法区分宇宙线的种类和能量

国际空间站上的AMS实验

- 自2011年5月19日起，AMS已持续运行超过10年收集了超过1800亿个宇宙线数据

AMS 磁谱仪

穿越辐射探测器 (TRD)

硅微条径迹探测器 (Tracker)

环形切伦科夫探测器 (RICH)

电磁量能器 (ECAL)

上层飞行时间计数器 (TOF)

永磁铁

反符合计数器 (ACC)

下层飞行时间计数器 (TOF)

AMS测量电子的方法

传统方法

- 使用ECAL进行事例鉴别
- 使用ECAL测量电子能量

新的方法

- 使用TRD进行事例鉴别
- 使用磁铁和Tracker测量电子能量

新分析方法可大幅提高AMS的事例接受度

AMS测量的每天电子流强

第一次实现对每天的宇宙线电子流强的测量

Preliminary data
refer to upcoming AMS publication

- [1.00 - 2.97] GV $\Phi_e \times 1$
- [2.97 - 4.88] GV $\Phi_e \times 2$
- [4.88 - 7.09] GV $\Phi_e \times 4$
- [7.09 - 10.1] GV $\Phi_e \times 8$
- [10.1 - 19.5] GV $\Phi_e \times 25$
- [19.5 - 41.9] GV $\Phi_e \times 128$

分析电子流强的精细时间结构

Preliminary data, refer to upcoming AMS publication

小波分析

- 小波分析是一种研究能谱周期性特征的算法
- 与傅立叶变换不同，小波分析选取的基函数振幅会随着时间有不同程度的衰减，从而实现对周期局域化的分析

电子流强的周期性特征

Preliminary data, refer to upcoming AMS publication

电子流强的周期特征与刚度的依赖关系

Preliminary data, refer to upcoming AMS publication

2016上半年

2016下半年

电子流强中观测到的福布斯下降事件

Preliminary data, refer to upcoming AMS publication

总结

- 利用AMS所收集的宇宙线数据，精确测量了自2011年5月-2019年10月每天的电子流强
- 测量结果不但呈现出长周期变化趋势，也呈现出短周期特征
 - 可以在电子数据中观测到27天的周期
- 电子 ($Z=-1$) 与质子 ($Z=+1$)表现出不同的福布斯下降行为
- AMS将持续收集宇宙线数据，分析不同宇宙线成分流强，为研究太阳物理提供重要的实验支持