

## The Jülich High-Brilliance Neutron Source Project

Accelerator driven neutron sources provide a cost-efficient and attractive alternative to classical neutron sources like fission reactors. With the advent of high current proton accelerator systems, a novel class of such neutron facilities can be established termed High-Current Accelerator-driven Neutron Sources (HiCANS). Such sources can counteract the increasing shutdown of existing fission-based neutron sources and a decline in available neutron beam days in Europe.

The High Brilliance neutron Source project (HBS) at the Forschungszentrum Jülich develops such a HiCANS facility. It utilizes a 70 MeV and 100 mA pulsed proton linear accelerator providing tailored proton pulses with frequencies of 24 Hz and 96 Hz, respectively, to three optimized target stations. Due to the low energy nuclear reactions releasing neutrons from a high-power tantalum target, the target stations are compact in comparison to spallation neutron sources. It allows for an efficient neutron production, moderation and extraction and thus achieving competitive neutron instrument performances.

A detailed technical design report describing all relevant components ranging from accelerator, target, moderators up to the instruments was published recently. It describes a potential national neutron facility with up to 24 instruments for all kinds of applications.

We will present the current status of the High-Brilliance neutron Source (HBS) HiCANS project. In particular we will emphasize the experimental validation of our design and simulations for all components, including their interplay at the JULIC neutron platform.

**Primary authors:** SCHWAB, Alexander (Jülich Centre for Neutron Science, Forschungszentrum Jülich GmbH); Dr MAUERHOFER, Eric (Jülich Centre for Neutron Science, Forschungszentrum Jülich GmbH); PODLECH, Holger (Institut für Angewandte Physik, Goethe-Universität Frankfurt); Dr LI, Jingjing (Jülich Centre for Neutron Science, Forschungszentrum Jülich GmbH); Dr VOIGT, Jörg (Jülich Centre for Neutron Science, Forschungszentrum Jülich GmbH); Dr ZAKALEK, Paul (Jülich Centre for Neutron Science, Forschungszentrum Jülich GmbH); Dr PECHENIZKY, Iwan (Jülich Centre for Neutron Science, Forschungszentrum Jülich GmbH); Dr BAGGEMANN, Johannes (Jülich Centre for Neutron Science, Forschungszentrum Jülich GmbH); Dr CHEN, Junyang (Jülich Centre for Neutron Science, Forschungszentrum Jülich GmbH); Dr LIEUTENANT, Klaus (Jülich Centre for Neutron Science, Forschungszentrum Jülich GmbH); SCHMIDT, Norberto (Jülich Centre for Neutron Science, Forschungszentrum Jülich GmbH); Dr FELDEN, Olaf (Nuclear Physics Institute, Forschungszentrum Jülich GmbH); Dr MEUSERL, Oliver (Institut für Angewandte Physik, Goethe-Universität Frankfurt); DING, Qi (Jülich Centre for Neutron Science, Forschungszentrum Jülich GmbH); Dr GEBEL, Ralf (Nuclear Physics Institute, Forschungszentrum Jülich GmbH, GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH, ); Dr HANSLIK, Romuald (Central Institute for Engineering and Technology, Forschungszentrum Jülich GmbH); Prof. BRÜCKEL, Thomas (Jülich Centre for Neutron Science, Forschungszentrum Jülich GmbH); Dr GUTBERLET, Thomas (Jülich Centre for Neutron Science, Forschungszentrum Jülich GmbH); Dr RÜCKER, Ulrich (Jülich Centre for Neutron Science, Forschungszentrum Jülich GmbH); Dr BESSLER, Yannick (Central Institute for Engineering and Technology, Forschungszentrum Jülich GmbH)

**Presenter:** Dr ZAKALEK, Paul (Jülich Centre for Neutron Science, Forschungszentrum Jülich GmbH)

**Session Classification:** Instruments